

Yhteenveto vuoden 2015 palautetuista pentuetiedustelukaavakkeista

| Väri | M | MH | PS | V | Väri rist. | YHT. |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Astutuksia | 31 | 57 | 39 | 20 | 25 | 175 |
| Tyhjiä | 2 (6,45%) | 5 (8,77%) | 2 (5,13%) | 2 (10%) | 1 (4%) | 13 (7,43%) |
| Syntyneet pentueet | 29 | 40 | 44 | 17 | 5 | 162 |
| Käytetty keinosiemennystä | 1 (3,23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,57%) |
| Ei tietoa astutuksesta | 0 | 2 (3,51%) | 0 | 1 (5%) | 2 (8,00%) | 5 (2,86%) |
| Elävänä synt. | 136 | 230 | 162 | 93 | 112 | 744 |
| Uroksia | 60 | 110 | 83 | 46 | 65 | 368 |
| Narttuja | 76 | 120 | 79 | 47 | 47 | 376 |
| Kuolleena synt. | 11 (7,48%) | 13 (5,35%) | 4 (2,41%) | 2 (2,11%) | 10 (8,2%) | 40 (5,10%) |
| Syntyneet yht. | 147 | 248 | 170 | 98 | 127 | 784 |
| Pentuekoon keskiarvo | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 5,3 | 5,1 | 4,6 |
| Lopetetut* | | 2 (0,82%) | 2 (1,20%) | 1 (1,05%) | 1 (0,82%) | 7 (0,94%) |
| Itsestään kuolleet* | 9 (5,81%) | 4 (2,02%) | 6 (2,91%) | 3 (3,23%) | 0 | 11 (1,48%) |
| Synt. | | | | | | |
| keisarinleikkaus | 4 (12,9%) | 9 (15,79%) | 9 (23,08%) | 4 (25,00%) | 7 (28,00%) | 35 (21,6%) |
| ell avustamana | 1 (3,23%) | 3 (5,26%) | 0 | 1 (5%) | 1 (4%) | 6 (3,7%) |
| luonnollisesti | 23 (74,19%) | 35 (61,4%) | 25 (64,10%) | 11 (55%) | 15 (60,00%) | 110 (67,9%) |
| ei tietoa | 0 | 2 (3,51%) | 0 | 1 (5%) | 0 | 3 (1,85%) |
| Maksashuntti | 0 | 0 | 1 (0,68%) | 0 | 0 | 1 (0,13%) |
| Kitalaki- tai huulihalkio | 1 (0,68%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,13%) |
| Ruokatorven laajentuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liikuntaelinsairaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silmä- tai korvatulehdus | 0 | 2 (0,82%) | 0 | 0 | 0 | 2 (0,26%) |
| Muu tulehdus | 0 | 2 (0,82%) | 0 | 0 | 3 (2,46%) | 5 (0,64%) |
| Kivesvika | 1 (0,68%) | 0 | 1 (0,6%) | 2 (2,11%) | 0 | 4 (0,51%) |
| Purentavika | 1 (0,68%) | 5 (2,06%) | 0 | 1 (1,05%) | 0 | 7 (0,89%) |
| Väri virhe | 1 (0,68%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,13%) |
| Mutka-/koukkuhäntä | 9 (6,12%) | 1 (0,41%) | 1 (0,6%) | 0 | 2 (1,64%) | 13 (1,66%) |
| Lyhyt häntä | 0 | 2 (0,82%) | 0 | 0 | 0 | 2 (0,26%) |
| Napatyrä | 4 (2,72%) | 8 (3,29%) | 3 (1,81%) | 5 (5,26%) | 5 (4,10%) | 24 (3,06%) |
| Muut sairaudet | 1 (0,68%) | 3 (1,23%) | 0 | 0 | 3 (2,46%) | 7 (0,89%) |

* Elävänä syntyneistä

Muut sairaudet (kaikki värit):

1/7 reikä sydämen väliseinässä

2/7 vatsa-aukile

1/7 vesipää

1/7 pulmonaalitenoosi eli keuhkovaltimoläpän ahtauma

1/7 sydämen sivuääni (ultrattu terveeksi 6kk iässä)

1/7 syntynyt karvattomana, puutoksia pysyvissä hampaissa 7kk iässä

KEINOSIEMENNYKSEN SYYT (kaikilla väreillä yhteensä 1 siemennystä)

1/1 Kokematon narttu, progesteroniarvojen perusteella juoksu menossa ohi.

KEISARINLEIKKAUSSYYT (kaikilla väreillä yht. 35 sektiota):

Iso pentu tulossa ensimmäisenä; tai kaksi tai useampi pentu tulossa yhtä aikaa; tai pennun virheasento: 9/35

Polttoheikkous tai polttoheikkoudeksi tulkittava syy: 3/35

Kohtu ei pystynyt supistumaan (kohtu venyttynyt tai revennyt, iso pentue): 0/35

Yksiköinen tiineys (kasvattajan oma päätös tai eläinlääkärin suositus sektioista): 1/35

Kuollut pentu ensimmäisenä: 4/35

Isot pennut: 4/35

Hätäsektio (istukoiden irtoaminen): 1/35

Kuollut pentu viimeisenä: 0/35

Suuri pentu viimeisenä: 1/35

Yliaikainen tiineys, liian varhain alkanut synnytys, viikonloppu tulossa tai muu kasvattajan päätös: 1/35

Kohtu liian venyttynyt pystyäkseen supistumaan 2/35

Kohdunsuu sulkeutui kesken synnytyksen: 0/35

Emä menehtyi sektiossa: 2/35

Sektion syy ei tiedossa: 9/35

SYYY ELÄINLÄÄKÄRIAVULLE SYNNYTYKSISSÄ (kaikilla väreillä apua tarvittiin yht. 6 synnytyksessä)

Iso tai kuollut pentu tulossa ensimmäisenä tai kaksi pentua tulossa yhtä aikaa tai pennun virheasento: 4/6

Oksitosiinin tarve: 1/6

Ennenaikainen synnytys: 0/6

Polttoheikkous: 0/6

Ultraus tai röntgen pentumäärän selvittämiseksi: 0/6

Ei tietoa: 1/6

Polttoheikkouden takia tehtyjen sektioiden kehitys:

| VUOSI | SEKTIOITA (% synnytyksistä) | POLTTOHEIKKOUS KPL | POLTTOHEIKKOUS % |
|-------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2015 | 35 (21,6%) | 3 | 8,57% |
| 2014 | 23 (17,04%) | 3 | 13,00% |
| 2013 | 22 (14,38%) | 7 | 31,18% |
| 2012 | 22 (13,92%) | 4 | 18,18% |
| 2011 | 23 (14,94%) | 5 | 21,74% |
| 2010 | EI VERTAILUTIETOJA | | |
| 2009 | 34 (19,32%) | 4 | 11,76% |
| 2008 | 32 (20,25%) | 12 | 37,5% |
| 2007 | 33 (16,76%) | 8 | 24,2% |
| 2006 | 19 (18,80%) | 2 | 10,5% |
| 2005 | 13 | 3 | 23,1% |
| 2004 | 24 | 4 | 16,7% |

Keisarinleikkauksien määrä on edelleen merkittävä ja näyttää olevan kasvussa. Varsinkin polttoheikkouteen liittyviin sektioihin on syytä kiinnittää huomiota jalostusvalintoja tehtäessä.

Jalostustoimikunta toivoisi saavansa astutusilmoituksen kaikista pentueista, myös niistä jotka eivät pääse pentulistalle. Jos kasvattaja haluaa pentueen listalle vasta tiineyden varmistuttua, siitä voi ilmoittaa Lisätietoja-kohdassa. Näin saamme mahdollisimman kattavat tiedot kerättyä kaikesta astutukseen ja pentuihin liittyvästä. Myös kuolleiden pentujen lähettäminen Eviraan avattavaksi on suositeltavaa, koska kuolinsyy saattaa joskus olla jokin tarttuva sairaus ja sen selvittäminen voi pelastaa muun pentueen. Samalla saadaan tieto mahdollisesti perinnöllisistä vioista. On tärkeää sekä rodulle että kasvattajalle itselleen selvittää mm. pentujen kuolinsyyt, keinosiemennyksen ja sektion/ell avun tarpeen syyt ym.