

Yhteenveto palautetuista	2024										syntyneet SKL									
Väri	M		MH		PS		V		Väriřist.		YHT.									
Astutuksia	29	23%	35	28%	30	24%	22	17%	10	17%	126									
Tyhjia	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	1	1%	3									
Syntyneet pentueet	29		35		30		20		9		123	153	80,39%							
Käytetty keinosiemennystä	2		2		1		0		0		5									
Avustettu astutus	0		0		0		0		0		0									
Elävänä syntyneitä pentuja	M		MH		PS		V		Väriřist.		YHT									
Uroksia	81		90		67		49		26		313	51%								
Narttuja	63		88		52		47		23		273	45%								
Kuolleena synt.	9		8		5		2		2		26	4%								
Syntyneet yht.	153		186		124		98		51		612	754								
Pentuekoon keskiarvo	5,3		5,3		4,1		4,9		5,7		5,0									
Lopetetut*	1		0		1		2		0		4	3%								
Itsestään kuolleet*	2		1		5		2		5		15	12%								
keisarinleikkaus	3		13		8		1		1		26	21%								
ell avustamana	0		0		0		0		1		1	1%								
luonnollisesti	25		22		24		17		8		96	78%								
Synnytyksessä kuollut narttu	0		0		1		0		0		1	1%								
Ei tietoa synnytyksestä	0		0		0		2		0		2	2%								
KITALAKIHALKIO	0		0		0		0		0		0	0%								
RUOKATORVENLAAJENTUMA	1		0		0		0		0		1	1%								
PURENTAVIKA	1		1		0		2		1		5	4%								
KOUKKU/MUTKAHÄNTÄ	2		4		4		0		0		10	8%								
NAPATYRÄ	2		6		1		3		3		15	12%								
TULEHDUKSET	0		0		0		0		0		0	0%								
KIVESVIKA	2		3		2		3		1		11	9%								
MUUT SAIRAUDET	0		1		0		0		1		2	2%								

Keinosiemennyksen syyt:

luonnollinen astuminen x2, mutta nartun ahdas emätin esti astumisen "loppuun asti", siksi astutus varmistettiin keinosiemennyksellä

Kokematon uros

Oletettu astutus ajankohta olisi pitänyt vasta tulla mutta proge-testin tulos näytti muuta.

Nuori uros, intoa oli enemmän kuin vielä osaamista. Alkoi vasyä ja niin päädyimme siemennykseen.

Progen mukaan astutuksella oli kiire ja koska astutus ei toteutunut ensimmäisellä yrityksellä niin halusin käyttää keinoheidelmöstä, koska yhteensattumien vuoksi nartun pennuttamista oli jo kahdesti siirretty. Narttu täyttää tammikuussa jo viisi vuotta.

Keisarinleikkauksen syyt:

Narttu kivulias ja synnytyks ei edennyt. Eläinlääkäri totesi, että ensimmäisenä tulevan pojan, joka isoi, sydänäänien heikentyneet, joten leikkaukseen.

Ensimmäinen syntyi luonnollisesti mutta pentujen isojen kokojen vuoksi loput ei mahtuneet tulemaan joten loput sektioitiin

Kaikki meni hyvin section jälkeen. Alkoi hoitamaan pentujaan, ja antoi hyvin imeä. Maitoa tuli hyvin, jo ennen sektiota. Synnytyks ei käynnistynyt, kalvo pihalla.

Supistukset alkoivat hyvin, mutta ensimmäinen pentu oli väärässä asennossa eikä tullut ulos. Päädyttiin keisarinleikkaukseen, koska sykkeitä oli vain yksi ja vatsassa näkyi nestettä ja oli epäily revenneestä kohdusta. Kaikki pennut saatiin elävinä ja virkeinä ulos.

Hienot työnöt, mutta ei vaan edennyt. Vielä esilääkitynkin työntöni voimakkaasti. Sektion syy pentu virheasennossa.

Ensimmäinen pentu syntyi luonnollisesti kotona. Sen jälkeen alkoi kaksi pentua syntymään samaan aikaan ja molemmat olivat näkyvässä. Pennut eivät kokoensa puolesta mahtuneet ulos, joten loput kolme pentua syntyi keisarinleikkauksella Tamminson Evidenssiassa.

Fimä sektioi hyvin lääkityksestä ja kaikki pennut olivat virkeitä ja kimmossa.

Ensimmäinen pentu ei edennyt

Synnytyks käynnistyi normaalisti, ei edennyt. Kohtu venynyt eikä kyennyt supistelemaan.

Ensimmäinen pentu syntyi luonnollisesti, isokokoinen ja kehityshäiriö (vatsa-aukio). Toista ei kuulunut, eli ultrassa pennulla vahva syke ja nartulla kaikki hyvin, lääkityksellä yritetty ensin edistää. Ei tehonnut, joten sektio, jonka sukuvaiheessa nartun sydän pysähtyi eikä vastetta pitkään elvytykseen.

Avautumisvaihe eteni normaalisti, kunnollisia ponnistuksia ei ollut. Eläinlääkärin vastaanotolle, kun alkoi tulla vihreää eritettä. Tehtiin keisarinleikkaus, ensimmäinen pentu oli menossa selkää edellä kanavaan.

Ensimmäinen pentu oli niskatarjonassa eikä pystynyt syntyymään.

Pihlöt liian heikot

Yhden pennun istukka repesi ja sydänäänät heikkenivät

Polttoheikkous

Synnytyks ei edennyt normaalisti, joten ei pääty keisarinleikkaukseen. Viimeinen pennuista oli polttoheikkouden syy: sillä oli paha kehityshäiriö eikä edennyt syntymästä pidempään.

avautuminen oudon pitkä, käytiin jo kerran tarkistamassa kohdun suu ei auki vielä. Työnnot alkoivat, tulppa, kokeilin jotakin terävää tuntui, olin sopinut että mennään suunnuntai yo tietenkin, kynnärpää edessä tulossa yksi, toinen ositain alla ja kolmas sivusta. röntgenissä näkyi kuulemma 6 eka kerta kun ei saanut olla mukana enää en suostu, kun toivat leikkurista perusta olikin 8.narttu suht pienkokoinen joten iso homma oi, kaikki meni kaikki pennut erittäin virkeitä emä hoiti hyvin ja imetti leikkiä nautti pennuista kuten minäkin.

Täysinäisen kohdun takia supistukset eivät olleet olleet niin voimakkaita ja ensimmäinen pentu jumissa. Maha ei myös laskeutunut samaisen

Täysinäisenäisen takia. Sektioon näkötettiin, koska kohtu oli niin näköstä krammissa. Fimän eurtin ruvattihi sektiohuavan sulkeamisen jälkeen. Fimä saatiin onneksi elvettävä ja vii tänä näivänä hyvin.

Pentuja syntyi luonnollisesti kotona kaikkiaan 3kpl, joista toinen virheasennossa (niska edellä) ja tunnin työn ja reilun avustamisen jälkeen. Tämän jälkeen kolmas syntyi helposti, mutta neljäs jälleen samassa virheasennossa ja nartun voimat loppuneet. Häläsektio, virheasennossa ollut pentu kuollut, näiden lisäksi kolme virkeää pentua.

Synnytyks ei edennyt, poltot loppuivat.

Pentuja oli kaksi ja ne olivat niin suuria, että eivät mahtuneet syntyymään luonnollisesti, minkä vuoksi eläinlääkäri päätti keisarinleikkaukseen, supistukset olivat normaalit.

4 pentua syntyi normaalisti, viides pentu oli iso, kuoli koska en saanut ulos ajoissa. Viimeinen pentu leikattiin.

Kuollut pentu tukkeena.

Emällä ei tullut lainkaan poltoja ja pentujen sydänäänät alkoivat heiketä

Viisi pentua syntyi normaalisti, kuudes pentu jouduttiin leikkaamaan.

Synnytyks alkanut normaalisti. Iso pentu juuttui virheasennossa synnytykskanavaan, minkä vuoksi turvaututtiin keisarinleikkaukseen.

Kuolleet/lopetetut pennut:

Alkkehittynyt

1 + 1 syntyi kuolleena, elvytyks ei auttanut

Pennulla oli luonossa paha halkio ja napanuora oli liian yhäällä kiinni.

Lopetetut: Happivaje-> hengityksen haukkominen

Kuollut: hidas synnytyks (syntyi takajalat edellä), liian pitkän aikaa kanavassa ennen kuin syntyi.

Ei alkanut syömään

Eloton, ei vasta nyt elvytykseen, ennen aikojaan irronnut istukka?

