

Yhteenveto palautetuista pentuetiedustelukaavakkeista											syntyneet SKL tietokannassa	
2025												
Väri	M		MH		PS		V		Väririst.		YHT.	
Astutuksia	37	30%	37	30%	33	27%	12	10%	5	10%	124	
Tyhjiä	2	2%	4	3%	3	2%	1	1%	0	0%	10	
Syntyneet pentueet	35		33		30		11		5		114	128
Käytetty keinosiemennystä	4		3		2		0		0		9	89,06%
Avustettu astutus	0		0		0		0		0		0	
Elävänä syntyneitä pentuja	M		MH		PS		V		Väririst.		YHT	
Uroksia	92		83		66		29		7		277	50%
Narttuja	71		82		52		34		17		256	47%
Kuolleena synt.	6		2		6		1		1		16	3%
Syntyneet yht.	169		167		124		64		25		549	606
Pentuekoon keskiarvo	4,8		5,1		4,1		5,8		5,0		4,8	
Lopetetut*	1		2		0		0		1		4	4%
Itsestään kuolleet*	4		3		2		0		0		9	8%
keisarinleikkaus	4		1		3		1		0		9	8%
ell avustamana	1		2		2		0		0		5	4%
luonnollisesti	29		25		24		9		5		92	81%
Synnytyksessä kuollut narttu	0		0		0		0		0		0	0%
Ei tietoa synnytyksestä	1		5		1		1		0		8	7%
KITALAKIHALKIO	0		0		0		0		0		0	0%
RUOKATORVENLAAJENTUMA	0		0		0		0		0		0	0%
PURENTAVIKA	0		0		0		1		0		1	1%
KOUKKU/MUTKAHÄNTÄ	7		2		0		2		4		15	13%
NAPATYRÄ	1		5		0		0		0		6	5%
TULEHDUKSET	0		0		0		0		0		0	0%
KIVESVIKA	1		2		1		0		0		4	4%
MUUT SAIRAUDET	0		0		2		0		0		2	2%
Keinosiemennyksen syyt:												
Molempien koirien kokemattomuuden vuoksi. Yritys hyvä mutta se nappisuoritus jäi uupumaan.												
Juoksu eteni odotettua nopeammin ja prog.arvo oli noussut korkealle												
Normaali astuminen jo aiemmin, mutta eivät jääneet kiinni. Tämän vuoksi varmistus siemennys.												
Yrittävät, ei onnistu loppuun asti												
Luonnollinen astutus ei onnistunut kunnolla ja tiineyden varmistamiseksi narttu keinosiemennettiin. Keinosiemennyksessä ilmeni, että nartulla oli ahdas emätin.												
Varmistus												
Luonnollinen astutus ei onnistunut loppuun saakka, narttu kookas ja uros turhan hätäinen. Siemennetty kohtuun korkeiden progesteroniarvojen vuoksi.												
Koirat eivät jääneet nalkkiin niin varmistettiin onnistuminen.												
Astutettiin myös luonnollisesti mutta eivät jääneet nalkkiin, joten varmistettiin keinosiemennyksellä.												
Keisarinleikkauksen syyt:												
Henkiin jäänyt pentu syntyi luonnollisesti ensin.												
Toinen pentu oli erittäin kookas ja jumissa, ja päädyttiin keisarinleikkaukseen. Pentu ei valitettavasti selvinnyt.												
Vrk 57 narttu alkoi vuotamaan ja tidenttiin ensimmäisenä tulevan pennun olevan kuollut. Sekä emän että kahden muun pennun turvallisuuden takia päädyttiin hätäsektioon vrk 57.												
Lämmöt laskivat mutta synnytys ei käynnistynyt.												
Penttu oli poikittain.												
Astutuksesta 67 vrk kun alkoi synnytys, varsinaiset työntöpolitteet eivät koskaan alkaneet. Leikattiin vuorokauden sisällä												
Synnytys alkoi normaalisti poltoilla ja ponnistuksella mutta ei edennyt ja alkoi valua vihertävää nestettä, jolloin lähdimme eläinlääkäriin												
Avautuminen eteni mallikkaasti ja hyvät supistukset. Ensimmäistä pentua ei vain syystä, joita eläinlääkärikään ei ymmärtänyt, saatu ulos. reitti oli auki ja yritimme vielä eläinlääkäriasemalla parin tunnin ajan.												

